BUIR-BLIESHEIMER
Info-Service

Nr. 16 vom 02.05.2025

3. Aktuelle Stunde am Versuchsfeld Nörvenich

Am **07.05.25** findet unsere **3. Feldbegehungen in Nörvenich** statt. Los geht es um **9 Uhr** am Versuchsfeld. Nächster Termin: 21.05.2025 Wir freuen uns auf Sie!!

Wetter – kurz und knapp

Bis Samstag sonnig, trocken bis 24°C; Samstag regnerisch. Ab Sonntag wird es merklich kühler, heiter und weiterhin trocken.

Zuckerrüben

Die Bekämpfung der schwarzen Bohnenlaus hat vielfach in den letzten Tagen stattgefunden, achten Sie weiterhin auf Befall. Zur **Erstbehandlung empfehlen wir Pirimor G mit 300 g/ha** (Notfallzulassung; Bekämpfungsschwelle 30% befallene Pflanzen; Pirimor G wirkt vorwiegend über die Dampfphase und darf nur 1x eingesetzt werden). Der Saugschaden, insbesondere auf Trockenstandorten, ist nicht zu unterschätzen. Sollte eine Insektizidmaßnahme bei Ihnen anstehen, achten Sie auf ausreichend Abstand zwischen den einzelnen Maßnahmen. Die letzte NAK-Herbizidmaßnahme muss mind. 3 Tage her sein; zur einer Folgebehandlung sollte ebenfalls mind. 36 Stunden Abstand eingehalten werden.
Ebenso ist nun vielfach die 2. NAK appliziert worden. Zwischen der 2. und 3. NAK (ab BBCH 16) steht bei Bedarf nun eine Solo-Gräsermaßnahme, ggf. incl. Versiegelung gegen Neuauflauf mit Spectrum, an.

Gräser/Hirsen **Targa Super 0,6 l/ha + Spectrum 0,6 l/ha**

oder

Targa Super 1,0 l/ha

ab ca. 18 cm Wuchshöhe

Distel **Vivendi 1,2 l/ha**



Bei geplanten Gräsermaßnahmen achten Sie bitte auch auf ausreichend Abstände zwischen den Behandlungen. Die Gräser sollten für einen guten Wirkungserfolg ausreichend Blattmasse gebildet haben. Gegen Rispen und Ackerfuchsschwanz (Problemstandorte) ist z. B. Select 240 EC 0,75 l/ha + Radiamix zu bevorzugen.

BUIR-BLIESHEIMER
Info-Service

Nr. 16 vom 02.05.2025

Winterweizen

Durch die Regenfälle und die warmen Temperaturen haben sich die Weizenbestände enorm schnell entwickelt. Frühe Sorten (Obiwan, Balzac, früh gesäter Chevignon) schieben das Fahnenblatt! Wenn das Fahnenblatt voll entwickelt ist, sollte darauf geachtet werden, dass sie Ihren Fungizidschutz überprüfen. Liegt die T1-Behandlung schon länger als 14 Tage zurück, sollte in der nächsten Woche mit der T2-Maßnnahme zur Gesunderhaltung des Blattapparat begonnen werden. Unsere Hauptempfehlung bildet wieder das Produkt Revystar + Priaxor!
Diese Kombination bieten wir Ihnen im aufwandbezogenen **10 ha-Gebinde** (10l Revystar +10l Priaxor) an! Nutzen Sie Produkte mit dem jungen Azolwirkstoff **Revysol** (bester Azolwirkstoff bei Septoria), gerade wenn Sie in einer ersten Anwendung ein anderes Azol (z.B. Prothioconazol) angewandt haben, ist der Wechsel vorteilhaft, um weitere Anpassungen zu verzögern. Neben dem Revysol sind das Premium Carboxamid Xemium und das effektivste Strobilurin im Getreidebau **F500 (beste Rostleistung)** die weiteren Wirkstoffe im Revystar Priaxor!
Infektionssituation siehe BB-Info Nr. 15.

* EC 61 - 69 Temperatur > 20 °C, Niederschlag > 10 mm

BUIR-BLIESHEIMER
Info-Service

Nr. 16 vom 02.05.2025

Maisherbizide

Die Maisaussaat läuft, planen Sie nun den Herbizideinsatz für das 3-4 Blattstadium des Maises als optimaler Applikationstermin der Herbizide. Überschreitet der Mais das 6 – Blattstadium, ändert er seine Oberflächenstruktur und wird gegenüber Herbiziden empfindlicher.

Lösung mit Terbuthylazin und Nicosulfuron

Gräserstandorte mit Einj. Rispe, Nachtschatten, Kamille, Knötericharten, Weißer Gänsefuß, Quecke, Hirsearten, Ackerfuchsschwanz…

Successor TOP 4.0* + Nicosulfuron**
0,75 l/ha Haldis (Mesotrione)
+ 3 l/ha Successor T***
+ 0,6 – 0,8 l/ha Nicosulfuron**

Nicosulfuron-freie Lösung

Gräserstandorte mit Ackerfuchsschwanz, Flughafer, Einj. Rispe, Hirsearten und Quecke und einer breiten Mischverunkrautung …

MaisTer power + Bodenpartner
1,0 l – 1,5 l/ha MaisTer power
+ 1,5 l – 2 l/ha Spectrum Gold***
oder
+ 2,5 – 3,5 l/ha Successor T***

Terbuthylazin-freie Lösung

Gräserstandorte mit einer breiten Mischverunkrautung

Elumis P Pack* + Spectrum
1,0 - 1,25 l/ha Elumis** + 0,02 kg/ha Peak
+ 1,0 - 1,25 l/ha Spectrum

Nicosulfuron-und Terbuthylazin-freie Lösung

Gräserstandorte mit einer breiten Mischverunkrautung

Maister Power Flexx*
1,0 l – 1,5 l/ha
MaisTer power +
+ 0,2 – 0,3 l/ha
Merlin Flexx



* Flexible Aufwandmengen in Abhängigkeit von Termin, Bodenfeuchte, Witterung etc.
**Sortenverträglichkeit und Nicosulfuron-Auflage beachten!
*** Terbuthylazin-Auflagen beachten